




Gonorrea en Carolina del Norte, 2021



La gonorrea sigue aumentando entre hombres y mujeres




- Se reportaron 29.177 infecciones de gonorrea en 2021 (tasa de 276,5 por 100.000 habitantes).
- La gonorrea aumentó más entre los hombres que entre las mujeres. Entre los hombres, los diagnósticos de gonorrea aumentaron un 33%, de 11.696 en 2017 a 15.584 en 2021. Esto probablemente refleja un aumento real y también puede reflejar exámenes de detección en más sitios anatómicos.

Las disparidades por nivel de ingresos son particularmente grandes para la gonorrea

Las tasas de gonorrea son más altas en las comunidades más pobres.

Las personas que viven en áreas empobrecidas a menudo tienen menos acceso a los recursos, incluidos los recursos de salud. El retraso en recibir tratamiento puede aumentar el potencial de transmisión a otras personas.



*Estimaciones de personas que viven por debajo del umbral de pobreza dentro de un tramo censal y todas las estimaciones de población obtenidas de la Encuesta sobre la comunidad estadounidense, 2016-2020, estimación de cinco años.


Proporción de Secciones Censales que Viven en la Pobreza

La coinfección por gonorrea y VIH aumentó entre los hombres durante 2011-2019

El número de personas con gonorrea que también tienen VIH estaba aumentando y ahora parece haberse estancado.

La disminución de las pruebas durante la pandemia de COVID-19 puede resultar en una subestimación de la coinfección en 2020.

Los médicos deben ofrecer la prueba del VIH a todos los pacientes diagnosticados con gonorrea y hablar sobre la profilaxis preexposición (PrEP, por sus siglas en inglés) con aquellos cuya prueba del VIH es negativa.






¿Qué está haciendo Carolina del Norte con respecto a la gonorrea?

- Carolina del Norte financia exámenes de detección de gonorrea para todas las mujeres que son atendidas en centros de atención médica financiados con fondos públicos, como los departamentos de salud locales y los entornos de planificación familiar.
- Las enfermeras del Programa de Capacitación y Asistencia Técnica de la División de Salud Pública de Carolina del Norte trabajan con el personal de condado para garantizar el tratamiento correcto de la gonorrea.
- Carolina del Norte participa en un programa nacional para identificar la gonorrea resistente a los medicamentos llamado Fortalecimiento de la Respuesta de los Estados Unidos a la Gonorrea Resistente (SURRG, por sus siglas en inglés). Para más información: https://www.cdc.gov/std/gonorrhea/arg/CARB_FACTSHEET-2018.pdf.

Tratamiento para la Gonorrea



Tratamiento de la Gonorrea 2021

- El tratamiento correcto de la gonorrea es muy importante para prevenir el Desarrollo de Resistencia a los medicamentos.
- En 2021, los CDC actualizaron sus [Pautas para el Tratamiento de las ITS](#). Para la gonorrea, los regímenes de tratamiento incluyen:
 - Régimen de primera línea recomendado: Ceftriaxona (500 mg por vía intramuscular) (IM) en una dosis única para individuos <150 kg o 1 g para individuos ≥150 kg).
 - Recomendaciones de segunda línea: cefixima (800 mg por vía oral en una sola dosis) O gentamicina (240 mg por vía IM en una sola dosis) más azitromicina (2 g por vía oral en una sola dosis).
- Mientras en 2021 muchos proveedores no habían cambiado al nuevo tratamiento de primera línea, los datos preliminares de 2022 sugieren que la mayoría de las personas con gonorrea están recibiendo la recomendación de primera línea.

Lo que pueden hacer los CLÍNICOS

- Siempre pregunta a los pacientes sobre su actividad sexual y evalúa a aquellos que son sexualmente activos en todos los sitios de exposición (p.ej., faringe, uretra y recto); Vuelve a realizar la prueba 3 meses después del tratamiento y referir a las parejas sexuales para evaluación y tratamiento.
- Proporciona tratamiento de acuerdo con las Pautas de los CDC. (<https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/gonorrhea.htm>).
- Los casos sospechosos de [fracaso del tratamiento de la gonorrea](#) deben informarse de inmediato al [departamento de salud local](#) o División de Salud Pública de Carolina del Norte (919-733-3419).
- Para obtener otros recursos, visite el compendio de la Coalición Nacional para la Salud Sexual ([Compendio de Recursos de Salud Sexual y Reproductiva para Proveedores de Atención Médica](#)).

Lo que PUEDES hacer

Si tienes una infección de gonorrea, asegúrate de que tu y tus parejas reciban tratamiento y vuelvan a hacerse la prueba después de 3 meses. La gonorrea no tratada puede aumentar el riesgo de contraer el VIH y la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP).

Fuente de Datos: Sistema Electrónico de Vigilancia de Enfermedades de Carolina del Norte (NC EDSS, por sus siglas en inglés) (datos al 7 de septiembre de 2022) y Sistema mejorado de Notificación de VIH/SIDA (eHARS, por sus siglas en inglés) (datos a septiembre de 2022).